

รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๑๔๓ บัตร ทันเวลา ๑๒๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๑ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตารางที่ ๑ จำนวนบัตรรายงานโรคแยกเป็นรายสถานบริการประจำเดือน ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สถานพยาบาล	จำนวนบัตร	ส่งทันเวลา	ร้อยละ	ไม่ทันเวลา	ร้อยละ
รพ.สต.บ้านควนคำทอง	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านท่าดินแดง	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านป่าบาก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	๓	๓	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านหนองธง	๘	๘	๑๐๐	๐	๐
รพ.ป่าบอน	๑๑๖	๑๐๑	๘๗.๐๗	๑๕	๑๒.๙๓
รพ.สต.บ้านควนเพ็ญ	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านพรุพ้อ	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
รพ.สต.บ้านน้ำตก	๑	๑	๑๐๐	๐	๐
สอ.เฉลิมพระเกียรติ	๔	๔	๑๐๐	๐	๐
รวม	๑๔๓	๑๒๘	๘๙.๕๑	๑๕	๑๐.๔๙

ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของอำเภอป่าบอน (๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโรค	จำนวนป่วย(ราย) อ.ป่าบอน	อัตราป่วย/แสนประชากร อ.ป่าบอน
๑	อุจจาระร่วง	๔๗	๑๐๒.๒๙
๒	ปอดบวม	๒๒	๔๗.๘๘
๓	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑๘	๓๙.๑๘
๔	ไข้เลือดออก	๑๘	๓๙.๑๘
๕	ตาแดง	๑๓	๒๘.๒๙


ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับแรกของอำเภอป่าบอน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อันดับ ๑ โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๐๒.๒๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๙ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๕ - ๙ ปี, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี และ ๔๕ - ๕๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗, ๗, ๖, ๖, ๕, ๔, ๓ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๓ ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตรกร, อาชีพนปค. จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๑, ๘, ๘, ๗ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๔๕.๔๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นารี่, ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอง, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๕.๒๑, ๑๐๕.๐๓, ๘๑.๖, ๗๗.๓๑ ตามลำดับ


กราฟที่ ๓ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

อันดับ ๒ โรคปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pneumonia จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๗.๘๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๐ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๔๕ - ๕๔ ปี, ๓๕ - ๔๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๕ - ๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๑๐ - ๑๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๗, ๑, ๑, ๑, ๑, ๐ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๒ ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร, อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘,๑,๑ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๕ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลทุ่งนารี อัตราป่วยเท่ากับ ๗๓.๖๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบล วังใหม่, ตำบล ป่าบอน, ตำบล โคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ ๖๒.๓๔ , ๔๕.๐๑ , ๓๐.๖ , ๒๘.๙๙ ตามลำดับ

กราฟที่ ๖ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

อันดับที่ ๓ ใช้ไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pyrexia จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๙.๑๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๖ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔ ปี, ๕ - ๙ ปี, ๖๕ ปี ขึ้นไป, ๕๕ - ๖๔ ปี, ๒๕ - ๓๔ ปี, ๑๕ - ๒๔ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปี และ ๔๕ - ๕๔ ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๓, ๓, ๒, ๑, ๑, ๑ และ ๐ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๗ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืองานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๘ ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตรกร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕, ๓, ๒ ราย ตามลำดับ


กราฟที่ ๘ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกอาชีพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ ๖๐.๐๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หุ่นาริ, ตำบล ป่าบอง, ตำบล หนองธง, ตำบล โคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ ๔๒.๐๘ , ๔๐.๘ , ๓๑.๑๗ , ๒๘.๙๙ ตามลำดับ

กราฟที่ ๙ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามพื้นที่ อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๒.สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๕.๖๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๑.๙๓ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ป่าบอน, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ กงหรา, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ป่าพะยอม, อัตราป่วย เท่ากับ ๕๔.๔๑, ๓๙.๖๘, ๓๒.๐๒, ๒๔.๑, ๒๒.๗๘, ๑๒.๓๗, ๑๒.๓๓, ๑๑.๒๓, ๙.๕๑, ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๐ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค จำนวนทั้งสิ้น ๖๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓.๐๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วยเท่ากับ ๕๖.๖๓ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ อำเภอ ป่าบอน, อำเภอ กงหรา, อำเภอ บางแก้ว, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอ ปากพะยูน, อำเภอ ศรีบรรพต, อำเภอ เมืองพัทลุง, อำเภอ ศรีนครินทร์, อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ป่าพะยอม, อัตราป่วย เท่ากับ ๓๙.๑๘, ๑๒.๐๕, ๑๒.๐๑, ๑๑.๙๙, ๑๑.๙๑, ๖.๑๙, ๔.๗๖, ๔.๑๑, ๒.๒๕, ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๑ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๓.สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอง

๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๔.๔๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑๒.๒๐ ต่อประชากร แสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองธง, ตำบลทุ่งนารี, ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, อัตราป่วยเท่ากับ ๓๒.๓๓ , ๓๐.๐๑ , ๑๙.๓๓ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๒ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๓ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ




ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๓.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๙.๑๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลหนองธง อัตราป่วยเท่ากับ ๗๒.๗๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล ป่าบอง, ตำบล หุ่นาริ, ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย อัตราป่วยเท่ากับ ๖๑.๒ , ๓๑.๕๖ , ๓๐.๐๑ , ๐ ตามลำดับ

กราฟที่ ๑๔ แสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำแนกตามพื้นที่



ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

กราฟที่ ๑๕ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำแนกตามสถานบริการ





ที่มา : งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอง (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก รายตำบล ปี พ.ศ. 2566



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
Pattani Provincial Public Health Office



ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พัทลุง

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 17 ราย อัตราป่วย 3.2 ต่อแสนประชากร โดยติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ จำนวน 4 ราย และในพื้นที่ จำนวน 13 ราย




อัตราป่วยโรคไข้มาลาเรีย รายเดือน จ.พัทลุง เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565-2566



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


อัตราป่วยต่อแสน



- imported case* 4 ราย (*Plasmodium vivax* 3 ราย, *Plasmodium falciparum* 1 ราย)
- ในพื้นที่ 13 ราย (*Plasmodium knowlesi* 10 ราย, รอมบิเนียน 3 ราย)

ปี 2565-2566 (1 ม.ค.65-21 ก.พ.66)

จำนวน 17 ราย อัตราป่วย 3.2 ต่อแสนประชากร



*imported case ผู้ป่วยจาก ประเทศปากีสถาน(ป่าบอน), จ.ตาก(เมืองพัทลุง), จ.ระนอง(ศรีนครินทร์), จ.ยะลา(กงหรา)

ตาราง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย รายเดือน จ.พัทลุง (1 มกราคม 2560 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2566)

ปี พ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.66	ก.พ.66	รวม
2560	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-	3
2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
2562	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-	2
2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Median	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2565-2566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	17


ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พัทลุง



อัตราป่วยโรคไข้มาลาเรีย รายอำเภอ จ.พัทลุง ปี พ.ศ. 2566 (1 ม.ค. 2566 – 21 ก.พ. 2566)



ปี 2566 (1 ม.ค.66-21 ก.พ.66)
จำนวน 12 ราย อัตราป่วย 2.2 ต่อแสนประชากร



ที่มา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พัทลุง

23



อัตราป่วยโรคไข้มาลาเรีย รายอำเภอ จ.พัทลุง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 - 21 ก.พ.2566)



เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1-21 ก.พ. 2566)
จำนวน 6 ราย อัตราป่วย 1.1 ต่อแสนประชากร

